

## Jei neišnešiotas naujagimis susirgo neišnešiotų naujagimių retinopatija

Neišnešiotų naujagimių retinopatija – tai tinklainės kraujagyslių vystymosi liga. Iškart po gimimo naujagimis retinopatija neserga. Ligos simptomai pasireiškia praėjus 2-4 savaitėms po gimimo. Ligos požymiai gali palaipti mažėti ir išnykti be pasekmių. Tačiau neišnešiotų naujagimių retinopatija gali pasiekti ir kritinį lygį, kada būtinas operacinis gydymas, norint išvengti vaiko aklumo. Tinklainė operuojama lazeriu arba šalčiu. Kartais į stiklakūnį reikia suleisti vaistą.

Oftalmologas, įvertinęs naujagimio tinklainės būklę, pakartotinę apžiūrą skiria kas 1-3 savaites.

Dėl neišnešiotų naujagimių retinopatijos išoperuotą vaiką oftalmologas apžiūri savaitę po operacijos. Kitos apžiūros kartosis kas 1-2 savaites iki vaikui sukanka 2 mėnesiai. Po to rečiau – kas mėnesį, kol mažyliui sukanka 4-6 mėnesiai.

Po operacijos skiriami akių lašai, kuriuos reikia lašinti 1-3 mėnesius. Taip pat išoperuotiems naujagimiams rekomenduojamas ramus dienos režimas. Svarbu saugoti vaiką nuo peršalimo, traumų ir aktyvios mankštos. Ateityje išoperuoti dėl neišnešiotų naujagimių retinopatijos vaikai dažniausiai nešioja akinukus ir ilgai globojami gydytojo oftalmologo.